

COMPOSICION

<i>Trichoderma asperellum</i> cepa T34 (conidias secas)	11.3 %
Ingredientes inertes	88.7%

Contiene un mínimo de 1×10^9 ufc (unidades formadoras de colonias) por g de producto comercial.
Léanse detenidamente las instrucciones de esta etiqueta antes de la utilización del producto.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

PRECAUCIONES

Mantenga lejos del alcance de los niños.
Este producto no es para consumo humano.
Evite el contacto con los ojos y la piel.
Almacenar en nevera.

Lote y fecha de fabricación:

Contenido y Peso Neto Garantizados: **500 g**

Fabricado por: **Biocontrol Technologies, S.L.**
CIF: **B63545446**
Barcelona, España

TRATAMIENTO AL SUELO

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 36.693, Folio 50, Hoja nº: B 295205, Inscripción 1 con NIF B-63545446

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

T34 es un preparado a base de un microorganismo, un hongo, que protege las plantas y aumenta su resistencia frente algunas de las enfermedades más importantes de suelo (*Fusarium oxysporum*, *Rhizoctonia solani*, etc).

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE USO Y ALMACENAJE:

Almacenar en nevera (aprox. 4°C), lejos de los alimentos y bebidas. No comer, beber o fumar cuando se maneje el producto. Se recomienda llevar ropa, guantes, mascarilla y gafas protectoras cuando se use T34.

APLICACIÓN:

Disolver la cantidad necesaria de T34 en una pequeña cantidad de agua y agitar para conseguir una buena suspensión del formulado. Añadir esta suspensión al tanque de riego, con el volumen total de agua previsto para regar y remover durante su uso para conseguir una aplicación homogénea del producto.
Aplicar T34 en el penúltimo riego del día para asegurarse de que ningún resto de producto quede en el sistema de riego y para garantizar una buena penetración, reduciendo el riesgo de lavado.

DOSIS:

Semilleros: 10 g/m³ antes de enmacetar ó 0,5 g/m² tras la siembra.

Plantación/cultivo en suelo: 1 g/m² superficie cultivada tras el trasplante. Repetir la aplicación una semana más tarde, si la planta no fue tratada en semillero.

Durante el cultivo: Aplicar cada 2 ó 3 meses, antes de situaciones de riesgo y después de momentos de estrés.

Plantación/cultivo en contenedor: 5 g por 1000 macetas tras el trasplante. Repetir la aplicación a la semana, si la planta no fue tratada en semillero.

Durante el cultivo: Aplicar cada 2 ó 3 meses, antes de situaciones de riesgo y después de momentos de estrés.

COMPATIBILIDADES:

T34 es compatible con todos los fertilizantes líquidos e insecticidas/acaricidas. Mantener un plazo de no tratamiento de 7 días, antes y después de la aplicación de fungicidas.

GARANTÍA:

La compañía garantiza el contenido descrito en la etiqueta, en envases debidamente sellados, hasta que se sustrae de su control directo. Declinamos toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de su uso indebido.

Patente número: ES 2 188 385 B1

BIOCONTROL T34 es un producto aceptado por las reglamentaciones técnicas de Agricultura Ecológica- Directiva europea (CE) 2092/91 y modificaciones posteriores.
Licencia CAAE número 65/IN/0084/06, número de producto F1/001/0084